

!!! UWAGA HODOWCO !!!

RZEKOMY POMÓR DROBIU - NEW CASTLE DISEASE (ND)

Rzekomy pomór drobiu (ang. *Newcastle disease*, ND) stanowi ogólnoswiatowy problem dla branży drobiarskiej, powodując ogromne straty ekonomiczne w chowie i hodowli drobiu, co przekłada się na produkcję jaj i

mięsa drobiowego. ND jest wysoce zakaźną chorobą ptaków wywoływaną przez *Orthoavulovirus javaense* (OAV-J) a jego zjadliwe szczepy PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI ZWALCZANIA.




Na zakażenie wirusem rzekomego pomoru drobiu wrażliwe są zarówno ptaki gospodarskie, domowe, jak i dzikie. Najbardziej wrażliwe są w szczególności ptaki z gatunku kura domowa (*Gallus gallus*). U indyków z reguły nie dochodzi do rozwoju ciężkich objawów klinicznych choroby. Na ND chorują także ptaki łowne (bażanty, kuropatwy, przepiórki) oraz ptaki domowe (kanarki, papugi), a także strusie oraz gołębie.

BIOASEKURACJA!

Analogicznie, jak w przypadku grypy ptaków (HPAI)

UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)



OBJAWY KLINICZNE:

Okres inkubacji choroby wynosi od 2 do 15 dni (średnio 5-6 dni), u niektórych gatunków nawet powyżej 20 dni. Mając na uwadze powyższe dane, Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (WOAH) podaje, że okres inkubacji dla ND wynosi 21 dni. Obserwowane objawy kliniczne zależą od patotypu wirusa, gatunku i wieku ptaka, koinfekcji, warunków środowiskowych oraz statusu immunologicznego zwierzęcia. Co do zasady, w przebiegu ND, obserwuje się następujące objawy kliniczne:




1. sapanie, kaszel, kichanie i rżenie;
2. drżenia mięśni, paraliż skrzydeł i kończyn dolnych, nienaturalnie skrzywiona szyja;
3. biegunka (często zielonkawa).

A – letarg

B – zmiany krwotoczne i martwice w obrębie grzebienia

C – letarg i obrzęk okolicy oczodołowej

D – obrzęk głowy



SZCZEPIENIE DROBIU PRZECIWKO ND

Zgodnie z pismem Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 17.10.2025 r. drób utrzymywany w gospodarstwach w ramach MOL, RHD oraz sprzedaży bezpośredniej musi być szczepiony i pochodzić ze stad zaszczepionych. W celu zaszczepienia stada należy skontaktować się z lekarzem weterynarii opiekującym się stadem.

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększona śmiertelność, spadek nieśności, zmiany w strukturze jaj (jaja bez skorup), znaczący spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe, duszność.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim
ul. 3 Maja 34, 69-220 Ośno Lubuskie
tel.: (95) 757-60-56, fax: (95) 757-60-56
e-mail :piwslubice@zgora.wiw.gov.pl; bip.piwslubice.e-line.pl/